

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痛消炎パップ剤 ユーシップフェルビナク

【特長】

- ユーシップフェルビナクは、痛みの原因物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛などに効果をあらわすフェルビナクを配合しています。
- ユーシップフェルビナクは、粘着性に優れた基剤※と伸縮自在の不織布を使用していますので、関節部にもよくフィットします。 ※特許第 4410431号

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社 大石膏盛堂
電 話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効能・効果】

打撲、捻挫、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

＜使用方法＞

- 片側のライナーをはがし、薬面を患部に貼り、残りの片側のライナーをはがします。
- 汗でぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。（1枚14g）

フェルビナク…0.5g

添加物としてエデト酸Na、セラチン、L-メントール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、ジソプロパノールアミン、D-ソルビトール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、pH調節剤、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



4 987475 117210