

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ビーエスバン温感パッチ 第3類医薬品

〔特長〕

- ビーエスバン温感パッチは、温感刺激と消炎鎮痛作用により、こりや痛みによく効きます。
- ビーエスバン温感パッチは、小さなサイズで貼りやすく、めだたない貼り薬です。

〔 使用上の注意 〕

☒ してはいけないこと

く 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

⚑ 相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 脊	発疹・発赤・かゆみ・痛み

- (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

〔 成分・分量 〕

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量
サリチル酸メチル	5.0 g
dl-カンフル	1.5 g
I-メントール	3.5 g
トコフェロール酢酸エステル	0.3 g
ノナン酸バニリルアミド	0.02 g

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、脂環族飽和炭化水素樹脂、三二酸化鉄、黒酸化鉄、黄色三二酸化鉄、その他2成分を含有します。

〔 効能・効果 〕

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

〔 用法・用量 〕

1日1~2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1)小児に使用せる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(3)患部の皮ふは清潔にして、汗などをよく拭きとてからお貼りください。

(4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(5)皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。

(6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分~1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

〔 保管及び取扱い上の注意 〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔 包装 〕

直径2.8cm/枚……156枚入 保存袋付

製造番号

使用期限



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話 (0942)83-2112

受付時間 午前9:00~11:45 午後1:00~4:30(土、日、祝日を除く)