

【改訂内容】

<ケトプロフェンテープ20mg/40mg「パテル」>

改訂後(下線部は改訂箇所)	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>6. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 妊婦（妊娠期後期以外）、産婦、授乳婦等に対する安全性は確立していないので、これらの患者に対しては、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。 <u>シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。</u></p> <p>(3) 省略</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>6. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 妊婦（妊娠期後期以外）、産婦、授乳婦等に対する安全性は確立していないので、これらの患者に対しては、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。</p> <p>(3) 省略</p>

<ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg/100mg「ファイザー」、ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ファイザー」>

改訂後(下線部は改訂箇所)	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>5. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用</p> <p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。] <u>シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。</u></p> <p>(2) 省略</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>5. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用</p> <p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。]</p> <p>(2) 省略</p>

<ハップスターID70mg>

改訂後(下線部は改訂箇所)	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用</p> <p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[妊婦に対する安全性は確立していない。] <u>シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。</u></p> <p>(2) 省略</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用</p> <p>(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[妊婦に対する安全性は確立していない。]</p> <p>(2) 省略</p>